



Epromec



Excipiente oleoso

- Persistencia
- Resistencia a la lluvia
- Difusión por el animal
- **Eficacia**

Epromec. Composición: Eprinomectina 5,0 mg Excipientes: Butilhidroxitolueno (E321) 10 mg **Dosis:** 5 ml/50 kg de peso vivo **Especies de destino:** Bovino (carne y leche) **Indicaciones:** Tratamiento de infestaciones por los siguientes parásitos internos y externos sensibles a la eprinomectina: Barros (fases parasitarias): *Hypoderma bovis*, *Hypoderma lineatum* Acaros de la sarna: *Chorioptes bovis*, *Sarcoptes scabiei* var. *bovis* Piojos: *Damalinia* (Bovicola) *bovis* (piojo mordedor), *Linognathus vituli* (piojo chupador), *Haematopinus eurysternus*, (piojo chupador), *Solenopotes capillatus* (piojo chupador) Moscas: *Haematobia irritans* Prevención de reinfestaciones: El medicamento veterinario protege a los animales frente a reinfestaciones por: *Nematodirus helvetianus* durante 14 días. *Trichostrongylus axei* y *Haemonchus placei* durante 21 días. *Dictyoaculus viviparus*, *Cooperia oncophora*, *Cooperia punctata*, *Cooperia surnabada*, *Oesophagostomum radiatum* y *Ostertagia ostertagi* durante 28 días. **Posología y vía de administración:** Unción dorsal continua. Administrar únicamente por vía tópica a la dosis de 1 ml por 10 kg de peso vivo. El medicamento veterinario debe aplicarse a lo largo de la línea media de la espalda en una estrecha franja desde la cruz hasta el nacimiento de la cola. **Presentaciones:** Botellas de 1, 2,5 y 5 litros. **Tiempo de espera:** Carne 15 días, leche 0 días.

Con **Epromec** puede controlar los parásitos con eficacia

Mejor aprovechamiento de la alimentación

Mayor producción de leche o ganancia de peso

Parásitos

Una vez que se propaga la infestación, el daño puede ser devastador. Los parásitos pueden:

- **Afectar negativamente el sistema inmunológico.**
- **Suprimir el apetito y reducir el consumo de alimento.**
- **Disminuir la producción de leche.**
- **Bajar las tasas de concepción.**

Elija un parásito. ¡Sí, lo mata!

Luche contra los parásitos con eprinomectina.

Ofrece control sobre más parásitos con hasta un 99,9% de eficacia.

- **Mata 39 especies y estadios de parásitos internos y externos.**
- **Controla eficazmente los gusanos inmaduros y adultos, piojos mordedores y chupadores, ácaros de la sarna y mosca de los cuernos.**



Epromec mata más gusanos independientemente del tiempo atmosférico

Es probable que la vacas estén infectadas con parásitos gastro intestinales, como Cooperia y Ostertagia.

- Incluso los niveles bajos de infección parasitaria pueden disminuir el apetito.
- Los gusanos también causan daño intestinal que provoca una disminución de la capacidad para absorber los nutrientes, que conlleva una disminución en la utilización del alimento.
- Incluso la infección subclínica puede conducir a pérdidas de producción, tales como la disminución de la ganancia peso y requerir más tiempo para alcanzar los pesos objetivo.
- La contaminación del pasto continúa el ciclo de infección.

Dosis

Administrar únicamente por unción dorsal continua a la dosis de 1 ml por 10 kg de peso vivo.

Periodo de supresión

Carne: 15 días

Leche: CERO DÍAS

Presentaciones

1 - 2,5 y 5 Litros



La solución más adecuada en manos del veterinario

