


Tolv[®]et 50_{mg/ml}

suspensión oral para porcino

Toltrazurilo

El tratamiento eficaz frente a *Isospora suis*



TOLVET 50 mg/ml SUSPENSIÓN ORAL PARA PORCINO

Composición: Toltrazurilo 50 mg/ml.

Indicaciones: Porcino (lechones de 3 a 5 días). Para la prevención de los signos clínicos de la coccidiosis en lechones neonatales en granjas con una historia confirmada de coccidiosis causada por *Isospora suis*.

Posología y vía de administración: Vía oral. Tratamiento animal individualizado. Cada cerdo debe ser tratado en el día 3-5 de vida con una dosis oral única de 20 mg de toltrazurilo por kg de peso vivo (equivalente a 0,4 ml de suspensión oral por kg de peso vivo).

Precauciones: Como con otros parasiticidas, el uso frecuente y repetido de antiprotozoarios de la misma clase puede conllevar el desarrollo de resistencias. No mezclar con otros medicamentos.


Contraindicaciones: Ninguna. Reacciones adversas: Ninguna conocida

Precauciones especiales de uso en animales: Se recomienda tratar todos los lechones de la camada. La aplicación de medidas higiénicas puede reducir el riesgo de la coccidiosis porcina. Por lo tanto, se recomienda mejorar simultáneamente las condiciones de higiene en la instalación afectada, particularmente la sequedad y limpieza.

Tiempo de espera: Carne: 73 días

Presentación: 250 ml

El tratamiento eficaz frente a *Isospora suis*



El toltrazurilo es un coccidicida que actúa contra todos los estadios de los desarrollos intracelulares de la coccidia en la merogonia (multiplicación asexual) y gamogonia (fase sexual).

- **Disminuye la aparición de diarrea mejorando así la GMD***
- **Disminuye la excreción de Ooquistes**
- **Se aplica cómodamente de forma individualizada**
- **Menor tiempo de espera: 73 días**

0,4 ml/kg entre los días 3-5 de vida en dosis única

*GMD Ganancia Media Diaria



Frente a complicaciones bacterianas por *E. coli*



EupenPlus

I.M.
1 ml / 10 Kg peso vivo

EupenPlus. Suspensión inyectable. **Composición (ml):** Amoxicilina (trihidrato) 150 mg, Colistina (sulfato) 250.000 UI. **Indicaciones:** Bovino, ovino, porcino y perros. Tratamiento de infecciones producidas por microorganismos sensibles a la asociación amoxicilina/colistina. **Posología:** Vía intramuscular. Bovino: 1 ml/10 kg p.v./48 h. Porcino: 1 ml/10 kg p.v./12 h 5 días. Ovino: 2 ml/10 kg p.v./24 h 5 días. Perros: 1 ml/10 kg p.v./12 h 5 días. **Tiempo de espera:** Bovino: 34 días (carne) y 4,5 días (leche). Porcino: 33 días. Ovino: 45 días (carne). **Presentaciones:** viales de 100 y 250 ml. Para el resto de apartados consultar prospecto. Nº Reg: 2575 ESP



UNISOL 5 mg/ml

Oral
1 ml / 3 Kg peso vivo

UNISOL 5 mg/ml solución oral para lechones. **Composición (ml):** Enrofloxaco gastro-intestinales producidas por *Escherichia coli*. **Posología:** Oral. 1 ml (pulsación)/3 kg p.v. **Tiempo de espera:** 10 días. **Presentación:** envase de 250 ml con dosificador. Para el resto de apartados consultar prospecto. Nº Reg: 2047 ESP