



LIVERFINE




Equilibrio metabólico en cerdas primerizas

^ Ficha Producto

LIVERFINE

Equilibrio metabólico en cerdas primerizas



Periparto período crítico:

- Período de **mayor demanda energética** en las cerdas.
- **Disminución del apetito** causado por la **presencia de cuerpos cetónicos**.
- **Consumo de sus propias reservas** y rápida **disminución de la condición en la cerda**.
- Problemas más **acusados** en las **cerdas primerizas** y sus camadas.



Consecuencias de la Cetosis Porcina en Periparto:

- Inapetencia y, por lo tanto, menor producción de leche.
- Baja ganancia de peso de sus lechones y menor peso al destete.
- Incremento de la mortalidad predestete.
- Aumento del período destete-celo en las cerdas.
- Incremento de los días no productivos.
- Disminución de lechones nacidos al segundo parto

Resultados del uso Liverfine en primíparas (15 ml/cerda) administrado 1 semana preparto:

(Prueba de campo, JISAP, Murcia 2025)

- +1,2 Kg de pienso consumido por la cerda.
- + 21 Kg de leche producido (inferido).
- +0,4 Kg de peso de los lechones al destete.
- -0,6 Días en intervalo destete-cubrición.
- +0,5 Lechones nacidos vivos en el 2º parto.
- x7 De retorno sobre el coste del tratamiento.



Descárgate el estudio llevado a cabo por Guillermo Ramis *et al.* 2025



Conclusión

- Las nulíparas, deben ser consideradas para un tratamiento en general con ácido mefeprónico, así como en animales con anorexia o disminución del apetito.