

Vademécum de Équidos



REGULADORES FUNCIONALES

Biosweet

5, 25, 250 y 1.250 kg

Extracto de malta



Equino - Bovino - Ovino - Caprino

Oral • Preparto: 100-250 ml / animal
• Tto. de cetosis: 1 litro / animal

☒ Sin receta

Dalmavital

50 ml

β-Caroteno 4%



Yeguas - Bovino - Cerdas

IM • Vacas y yeguas: 15 ml.
• Cerdas: 5 ml

○ No precisa período de supresión

Dalmazin

5 x 20 ml, 15 x 2 ml

d-Cloprostenol
0,0075%



Yeguas - Bovino - Cerdas

IM • Vacas: 2 ml
• Cerdas y yeguas: 1 ml

○ Carne: 0 días (bovino) y 1 día (cerdas)

Idrion

1 litro

Rehidratante líquido



Todas las especies

Oral • 35 ml / litro de agua de bebida,
7 días

☒ Sin receta

Gastazole

7,67 g/jeringa.

Omeprazol
370 mg/g

Omeprazol en pasta



Equinos

Oral • Úlceras: 4 mg/kg pv. 28 días.
• Preventivo: 1 mg/Kg pv.

○ Carne: 1 día

Liverfine

100 ml

Ácido
mefepónico 10%



Equino - Bovino - Caprino
Porcino - Perros

IM - IP - IV • 1 ml / 10 kg p.v.

○ Leche: 0 días
○ Carne: 0 días

Nanut Foal

5 kg

Leche dietética
baja en proteínas



Equino

Oral • 100 g/900 ml

☒ Sin receta

Metabolik

500 ml

L-carnitina 5mg,
Ácido Lipoico 0,2mg,
Vitamina B6 0,12 mg,
Vitamina B12,
vitaminas y aminoácidos.

Équidos - Bovino - Ovino - Caprino

IV y SC • 0,5-1 ml/kg p.v. 2 veces durante 1 día

○ No precisa período de supresión



Pasmopina

50 ml

N-Butilbromuro
de escopolamina 2%



Equino - Bovino - Ovino - Porcino

IM - IV • 0,2 ml / 10 kg p.v.

○ Leche: 12 horas
○ Carne: 2 días (bovino), 9 días (porcino)
18 días (ovino) y 3 días (equino)

Uriavit BC Carnitina

1 kg de polvo soluble

L-Carnitina 5%
y vitaminas B y C



Todas las especies

Oral • 0,2-0,8 g / 10 kg p.v., 7 días

☒ Sin receta

Camdolor

100 y 250 ml

Meloxicam 2%

Equino - Bovino - Porcino

IM • 2 ml/100 kg p.v. (porcino)
SC - **IV** • 2,5 ml/100 kg p.v. (bovino)
IV • 3 ml/100 kg p.v. (equino)

○ Leche: 5 días
○ Carne: 5 días (porcino y equino)
y 15 días (bovino)



Deyanil Retard

10 y 50 ml

Dexametasona
isonicotinato 0,1%

Equino - Bovino - Perros

IM - **SC** • 0,5-2 ml / 10 kg p.v.

○ Leche: 3 días
○ Carne: 75 días



Dolofenac

100 y 250 ml

Diclofenaco 5%

Equino - Bovino - Porcino

IM - **IV** • 1 ml / 20 kg p.v.

○ Leche: 3 días
○ Carne: 15 días (bovino) y 12 días (porcino)

**Antiinflamatorio de elección
en cojeras**



Fatromine

100 y 250 ml

Flunixin 5%

Equino - Bovino - Porcino

IM - **IV** • 2 ml/45 kg p.v. (porcino y bovino)
• 1 ml/45 kg p.v. (equino)

○ Leche: 2 días
○ Carne: 14 días (bovino), 21 días (porcino)
y 28 días (equino)



Ketofarm

100 y 250 ml

Ketoprofeno 10%

Equino - Bovino - Porcino

IV - **IM** • Bovino y porcino: 3 ml/100 kg p.v.
• Equino: 1 ml/45 kg p.v. 3-5 días

○ Leche: 4 días
○ Carne: 0 horas



Rapison

50 y 100 ml

Dexametasona 0,2%

Equino - Bovino - Porcino

IM - **IV** - **IA** • 0,03 a 0,5 ml/10 kg p.v.

○ Leche: 60 horas
○ Carne: 7 días (bovino), 2 días (porcino)
y 11 días (equino)



Rheumocam

100 y 250 ml

Meloxicam 1,5%

Equino

Oral • 0,6 mg/kg p.v.

○ Leche: No usar en équidos cuya leche
se destine al consumo humano.
○ Carne: 3 días



NOVEDAD

Alutopic spray

200 y 400 ml

Aluminio 2,1%

Todas las especies

Tópico

✓ **Sin receta**



Bimodula

100 y 250 ml

Oxitetraciclina 10%

Equino - Bovino - Ovino
Porcino - Perros - Gatos

IM - **IV** • Cada 24 horas

IM • Long Acting

○ Bovino: carne 35 y leche 3 días
○ Ovino: carne 5 y leche 5 días



Vetramil pomada/spray/pads

30 y 180 gr / 100 ml / 5 pads.

Pomada, spray
y pads a base de miel

Equino - Perros - Gatos

Tópico • 1-2 veces al día

✓ **Sin receta**



Euthoxin

100 ml

Pentobarbital
sódico 50%

Equino - Bovino - Porcino - Perros -
Gatos - Exóticos

IM - **IC** • Según peso

○ No procede



Isoflurin

250 ml

Isoflurano
1000 mg/g

Equino - Perros - Gatos

Inhalatoria • Mediante mascarilla facial



Ketabel

25 ml

Ketamina 10%

Equino - Bovino - Ovino - Caprino -
Porcino - Perros - Gatos

IV - **IM** • 0,25-1 ml/10 kg p.v.

○ Carne: 1 día ○ Leche: 0 horas



Lidobel

100 ml

Lidocaína 2%

Equino - Perros

SC - **IM** - Perineural

○ Carne: 5 días ○ Leche: 5 días



Pronestesis

50 ml

Procaína 3,46%
Epinefrina 0,002%

Equino - Bovino - Ovino - Porcino

SC • 2,5-10 ml / animal
PN • 5-10 ml / animal

○ Carne: 0 días ○ Leche: 0 días



Crinar

Expositor 24 jeringas

Pamoato de pirantel
9,5 g/jeringa

Equino

Oral • 1 jeringa/animal

○ No usar en equino destinado
a consumo humano



Finvirus Eco

5 y 25 litros

Cloruro de Didecildimetilamonio 11,9%
Glutaraldehído 8,5%, Ácido glicólico 0,7%

• **Locales y recintos:**
- Rutinaria: 1:250/400
- Estricta: 1:100/200
• **Utensilios y medios de transporte:** 1:200
• **Pediluvios y nebulización:** 1:100.

✓ **Sin receta**

